

در هنگام مصرف سوپر استم ۳ سی به مرحله رشدی گیاه و مقدار مصرف توصیه شده دقت نمایید.

توضیحات	زمان مصرف	مقدار آب (لیتر)	مقدار مصرف	محصول
واکنش ارقام متفاوت ممکن است تفاوت داشته باشد	پنجه زنی تا زمان ظهور اولین گره	۲۵۰	۱-۱,۲۵ لیتر در هکتار	غلات (گندم، جو، چاودار، جو دو سر)
باعث جلوگیری از رشد رویشی زیاد و مقاومت به ورس می شود	۲۰-۳۰ روز پس از انتقال نشاء	۳۰۰	۲ لیتر در هکتار	برنج
باعث زود رس کردن محصول می شود	قبل از گل دهی	۲۰۰ تا ۳۰۰	۲ لیتر در هکتار	لوبیا و نخود
افزایش عملکرد و زود رسی	۲-۳ هفته قبل از گل دهی	۲۵۰	۲ لیتر در هکتار	سیب زمینی
گیاه کوتاه تر شده و غوزه ها یکنواخت تر می شوند	۹۰-۱۱۰ روز پس از کاشت	۲۰۰ تا ۳۰۰	۰,۵ لیتر در هکتار	پنبه
۲-۳ بار تکرار با فواصل ۱۵-۲۰ روز	اولین بار زمانی که گیاه ۲۵ سانتی متر است	۱۰۰	۱۰۰ میلی لیتر	گوجه فرنگی
-	قبل از گل دهی	۱۰۰	۱۰-۸۰ میلی لیتر	گیاهان زینتی
ریشه های بیشتر و ساقه قوی تر	در حضور دو برگ حقیقی	۱۰۰	۱۰۰ میلی لیتر	نشاء

از مصرف بر روی گیاهان تحت تنش یا آنها که به رشد رویشی کافی نرسیده اند خودداری کنید.